

RBC 20% Medicated Textured Calf Starter

MONENSIN

Medicated with Monensin @ 24 mg/kg As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria bovis* and *Eimeria zuernii* in cattle/
Médicamenté avec 24 mg/kg de monensin pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria bovis* ou *Eimeria zuernii* chez les bovins.

INGREDIENTS: A list of ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or registrant.

GUARANTEED ANALYSIS

Crude Protein	(min)	19.8	%	Sodium	(min)	0.16	%
Crude Fiber	(max)	7.4	%	Selenium	(min)	0.16	Mg/kg
Crude Fat	(min)	5.7	%	Vitamin A	(min)	7,500	IU/kg
Calcium	(min)	0.8	%	Vitamin D	(min)	1,875	IU/kg
Phosphorus	(min)	0.4	%	Vitamin E	(min)	30	IU/kg

Feeding Instructions: Feed this medicated calf grower ration to beef calves weighing 110 kg consuming 1.1 kg of total daily dry matter (1.0% of body weight) at a rate of 1.0 kg per day, to deliver monensin at 22 mg/kg in the daily dry matter. Feed in conjunction with good quality forage and provide fresh, clean water at all times.

Instructions d'alimentation : Donnez cette ration médicamenteuse de croissance aux veaux de boucherie de 110 kg consommant 1.1 kg de matière sèche quotidienne totale (1,1 % du poids corporel) à raison de 1,0 kg par jour, pour un apport de monensin de 22 mg/kg dans la matière sèche quotidienne. À associer à un fourrage de qualité et à une eau fraîche et propre en permanence.

WARNINGS:

1. Do not supplement monensin from other sources (eg. Other feedstuffs containing monensin or a slow-releasing device containing monensin). **2.** No withdrawal period or milk withholding time is required when treated at the recommended dose of 22 mg monensin per kg (0.0022%) of complete diet.

MISES EN GARDE:

1. Ne pas fournir du monensin supplémentaire provenant d'autres sources (p. ex., d'autres aliments contenant du monensin ou des capsules de monensin à libération lente). **2.** Aucune période de retrait, ni aucune période de retrait du lait n'est requise lorsque le produit est utilisé conformément à la posologie de 22 mg de monensin par kg (0,0022%) de ration complète.

CAUTIONS

1. Do not exceed recommended levels as reduced average daily gains may result. **2.** Do not use monensin-medicated feeds for the treatment of outbreaks of coccidiosis **3.** Do not allow dogs, horses or other equines or guinea fowl access to formulations containing monensin. Ingestion of monensin by these species has been fatal.

PRÉCAUTIONS

1. Ne pas dépasser les doses recommandées pour éviter de provoquer une réduction des gains quotidiens moyens. **2.** Ne pas utiliser les aliments contenant du monensin pour traiter les flambées de coccidiose. **3.** Empêcher les chiens, les chevaux, d'autres équidés et les pintades de consommer les aliments contenant du monensin, car l'ingestion du monensin par ces espèces s'est avérée fatale. **4.** Ce produit peut être utilisé dans les aliments contenant les agents liants suivants : bentonite (2 %), attapulgite (2 %), kaolin (2,5 %), lignosulfonate (4 %), carboxyméthylcellulose (0,1 %) ou Agri-Colloid

Do not feed to sheep. / Ne pas donner aux moutons.

DISCLAIMER: Individual results from the use of this product may vary due to management, environmental, genetic, health and sanitation differences.

Formulation by
Delta Animal Solutions Inc.
Didsbury, AB

Manufactured By:
Rochfort Bridge Colony
Mayerthorpe, AB



Net Wt 25.0 kg